

醫

方

集

解

醫方集解卷五

休寧汪昂訂菴輯著

男汪端其兩

第江桓殿武訂

姪汪惟寵子錫

瀉火之劑火者氣之不得其平者也五臟六腑各得其平則榮衛冲

笑故丹瀉火之劑是也亦有五府相火者如心火太盛必尅肺金肝火太盛

聖脾火之劑是也亦有五府相火者如心火太盛必尅肺金肝火太盛

小腸火之劑是也亦有五府相火者如心火太盛必尅肺金肝火太盛

肝火之劑是也亦有五府相火者如心火太盛必尅肺金肝火太盛

無鬱火之劑是也亦有五府相火者如心火太盛必尅肺金肝火太盛

病暴死者有諸病也中火病為多不可以不加察也○有以瀉為瀉者

大黃芒硝等藥連梗拍之類是也黃天冬玄參知母之類壯水之主

之類是也○有以滋為瀉者地黃天冬玄參知母之類壯水之主

以制陽光是也○有以補為瀉者參耆甘草瀉火之聖藥是也

三焦實火

黃連解毒湯

氏治劉護軍又云其自製者治一切火熱表裏俱盛狂

躁煩心口燥咽乾大熱乾嘔錯語不眠吐血衄血熱甚發斑也邪入于

奇方集解卷五

陽則狂心為熱所擾則煩燥則煩之甚也口燥咽乾火盛津枯也乾嘔  
熱毒上逆也錯語熱昏其神也不眠陰未得復也傷寒吐衄血者當汗  
不汗則熱逼血上行也發熱熱毒入胃也口乾尚書曰得有燥黃令人  
錯語正熱盛亦令人錯語若秘而錯語者宜承氣湯通而錯語者宜黃  
連解毒湯

黃連 黃芩 黃柏 梔子 等分

此手足陽明手少陽藥也三焦積熱邪火妄行故用黃芩瀉肺火于上

焦黃通瀉脾火于中焦也王海藏自黃連瀉火實瀉脾火實瀉脾火于下

焦梔子連瀉三焦之火從膀胱出蓋陽盛則陰衰火盛則水衰故用大

苦大寒之藥抑陽而扶陰瀉其亢甚之火而救其欲絕之水也然非實

熱不可輕投劉河間曰陽寒表熱極甚身痛頭疼不可忍或眩或嘔裏

惡不能退其熱勢之甚或大下後再下後熱勢尚甚木氣損虛而脉

不能實擬更下之恐脫而方死不下亦熱極而死或濕熱內餘小便赤  
流大便澀泄瀉頻併少而急痛者必欲作痢也並宜黃連解毒湯

本方去梔子名栢皮湯治三焦實熱用粥丸名三補丸治三焦病火

燥喉乾二便閉結及癰痰夜熱壯火宜降今以黃芩瀉上黃連瀉中黃

柏蕩下則壯火降而少火升氣本方去芩連加甘草名梔子栢皮湯景

得生而血得養三焦皆受益矣治傷寒發熱身熱發黃胃有瘀熱宜下之發熱為熱未作實益寒濕之

利小便便用梔子清肌表黃柏瀉勝能以和解之按傷寒發黃有在太陽

陽者與陽明發熱在胃者不同故仲景亦有不可下當于寒濕中求

治三黃瀉心湯治心下痞熱心氣不足吐血衄血大黃用酒蒸晒

丸次蜜丸名三黃丸治三焦積熱煩煩腫痛曰赤口瘡心煩煩躁大便

秘結小便赤澀及消渴癰瘦而止如何以不補心而反瀉心再後曰少

陰不足元陽無輔致陰血妄行故用大黃瀉其亢害之火又心本不足

脾肝各受火邪而病作故用黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心

之母血之舍也脾火是則血歸經而自安矣寇宗奭曰以苦瀉其熱

出血則熱為本血為標能去其熱則血不治而自歸經矣李士材曰古  
入用大黃治虛勞吐血意甚深微蓋瀉陰不降則清陽不化瘀血不去  
則新血不生也昂按此乃傷寒外感發熱而此細故用三黃寒瀉之劑  
若虛寒內傷吐衄而誤服此則殺人矣楊仁齋曰血遇熱則宣流故止  
血多用涼藥然亦有氣虛挾寒營氣虛散血亦錯行所謂陽虛陰必走  
是已法當溫中使血自歸經言理中湯如木香七氣湯加川芎或甘草  
煎湯甚効

本方加石膏淡豉麻黃名三黃石膏湯別見張本方水丸名三  
黃金花丸治中外諸熱癰汗咬牙夢驚悸吐血衄淋秘勞嗽骨蒸本方

加大黃名梔子金花丸去梔子加大黃名大金花丸治暑同

附子瀉心湯

治傷寒心下痞而復惡寒汗出者傷寒心下滿腹而痛

而不痛者為病為虛經曰心下痞按之濡關脈浮者為結胸為實腹健  
心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯大抵諸病皆熱故攻之多寒因  
此加附子恐三黃重損其傷非補虛也或下後復汗或下後陽虛故惡  
寒汗出口諸傷心湯皆治傷寒病滿在心胸不在胃也若雖病滿  
有熱熱虛實之不同保命集云脾不能行氣于門藏結而不散則為  
痞傷寒之痞從外之內故宜苦泄雖病之痞從內之外故宜辛散

大黃兩黃連兩黃芩兩附子一枚炮去皮  
破開煮取汁

此足太陽手少陰藥也吳鶴皋曰心下痞故用三黃以瀉痞惡寒汗出

故用附子以回陽非三黃不能去痞熱無附子恐三黃益損其陽寒熱

並用斯為有制之兵矣喻嘉言曰此知然既其真陽復虛之症故于三

附子湯未同此意大黃細辛各二兩附子一枚炮治陽下偏痛發熱脈

弦緊此寒也以溫藥下之陰中有陰當以溫藥下其寒後人罕識其指

○有川寒藥而治熱痞大黃黃連之類也有陰盛陽虛而痞用辛熱多而寒藥少者

黃大黃黃連加附子之類也有陰盛陽虛而痞用辛熱多而寒藥少者

半夏生薑甘草為心之類也經又曰傷寒大下後復發汗心下痞惡寒

者表未解也當先解表乃可以痞解表桂枝湯攻裏大黃黃連瀉心湯

經又曰本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解曰渴而煩躁小便利

者五苓散主之此有停飲故也○李東垣曰瀉心湯雖病下之大過亦作

痞傷痞下多亡陰陰者脾胃水穀之陰也胸中之氣因虛下陷于心之

分野故致心下痞宜升胃氣以血藥兼之若全用氣藥導之則痞益甚

其而從下之氣愈下降必變為中滿腹非

其治也按脾無積血心下不痞故須兼血藥

**本方去附子名三黃瀉心湯**見再去黃芩名大黃黃連瀉心湯**治傷**

**寒心下痞按之濡者關上脈浮**沉為實熱浮為虛熱按之自濡但

氣痞可同湯後曰以非痰飲結聚故無

虛寒

半

夏瀉心湯

治傷寒下之早胸滿而不痛者為痞身寒而嘔飲食不

下非柴胡

經曰傷寒五六日嘔血發熱柴胡症其下之不為逆必蒸蒸而

振却發熱汗出而解若心下滿而軟痛者此為結胸也大陷胸湯主之

若滿而不痛者此為痞柴胡不中與也宜半夏瀉心湯凡瀉心者皆

得經熱邪也

半夏升黃連兩黃芩甘草人參乾薑三枚

此手少陰足太陰藥也成氏曰否而不泰為痞苦先入心瀉心者必以

取半夏生薑也活人云結胸即痞胸脈沉者用瀉心湯實瀉心包肝  
以瀉肝李時珍曰仲景治心氣不足吐衄血者用瀉心湯實瀉心包肝  
脾胃四經其中之伏火也又治心下痞滿按之軟者用瀉心湯亦瀉脾  
胃之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之則痞滿乃寒傷營血邪結上  
焦胃之上脘在心故曰瀉心經曰太陰所至為痞滿又曰陽氣在上則  
生脾脹是已病發于陽而反下之則結胸乃邪熱陷入血分亦在上脘  
故大陷胸湯九芎用大黃亦道其胃血分之邪而散其熱也若結胸在  
氣分只用小陷胸湯痞在氣分只用半夏瀉心湯按發陽發陰諸解  
不同終成疑案李氏則以寒傷為陰病熱陷為陽病然仲景所用  
皆寒藥未嘗有所分也周揚俊則謂總屬下早致然似為近理

昔故以黃連為君黃芩為臣以降陽而升陰也辛走氣散痞痞者必以義

故以半夏乾薑為佐以分陰而行陽也欲通上下交陰陽者必和其中

故以人參甘草大棗為使以補脾而和中已下之後則痞熱消而大汗

以解矣黃連云此方藥味盡本理中人參黃芩湯方王海藏曰外症今

湯脈無力者半夏瀉心湯喻嘉言曰清瀉心湯原以瀉欲此症因嘔故

推半夏為君程郊清曰痞雖虛邪然表氣入裏結壅于心腸之分寒亦

成熱矣寒已成熱則不能外出而熱非實據又不能下行惟用苦寒從

其部而瀉之仍虛下焦之陰邪上入釐幸熱以溫之陰陽兩解不攻痞

而痞自散所以與熱互用若陰痞不開陽鬱即鬱而未成熱祇是上下

陰陽部分拒格而成瀉心之飲然不可用也又曰人皆曰什多亡陽不

却下多亦亡陽以亡陰中之陽故曰亡陰耳下焦之陽雖虛氣必上逆

則上焦之陽反因下而成實以火氣不下行故也治多瀉上補下心君

得苦寒而安則反能從陽引之入陰故岑連厄子瀉亦成補

本方除人參再加甘草前一兩合名甘草瀉心湯景仲治傷寒中風醫反下

之下利穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩醫復下之其痞益



甚此非結熱但以胃虛客氣上逆故使輒也為下後真虛胃弱內損陰

復真陰退虛熱大要症滿下利者為虛煩閉者為實按甘草甘和中益胃

故中滿症忌之而別錄甄權並云甘草能除滿以脾健通則滿除也觀

仲景用以消痞豈非取其散滿哉又按此乃傷寒之下利腸鳴也雜症

腸鳴亦多屬脾胃虛經云脾胃虛則腸鳴腹滿又云中氣不足腸鳴為之

苦湯宜參朮補劑加甘草苓連枳實乾薑等并漢又曰腹中水鳴乃火

激動其脈也宜三國湯加苓連枳實乾薑等并漢又曰腹中水鳴乃火

協熱微寒而治法相同陽症下利亦必裏虛而表熱乘之雖太陽邪症

下利亦然與表邪傳裏協熱下利無異至于陰陽協寒其症尤顯所以

云傷症下利誤溫則發黃出一本方加生薑四兩名生薑瀉心湯景仲

而死此等支離處尤當詳辨

汗解後胃中不和心中痞鞭乾噦食臭完穀不化脇下有水氣腹中

雷鳴下利客氣上逆伏飲搏膈故痛轉中氣不和故乾噦胃虛火盛邪

雷鳴下利謂之積熱利為汗後胃虛外損陽氣故加生薑以散邪滲飲

益胃復陽劉河間曰瀉而水穀變色者為熱不變色而泄微清者為

寒舌紅門燥滿小便黃赤水穀不化所謂邪熱不殺穀也此山本方除黃芩大

棗加枳實厚朴麥芽白朮枳實消痞丸東垣別見

熱胃

白虎湯

治傷寒脈浮滑裏有熱其有汗者為在表治為在裏裏及

三陽合病脈浮大腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗

則譫語下之則頭上生汗手足逆冷自汗出者陽明也面垢少陽症

也遺尿太陽症也三症之中陽明為多屬裏裏有和發表則煩熱甚

故譫語攻裏則陰氣下竭而虛陽上脫必瀉汗出而手足逆冷者自汗

出者三陽熱甚也與通治陽明病脈洪大而不惡寒反惡熱頭痛自

汗口渴舌胎白痛鼻乾不得臥心煩躁亂目痛潮熱或陽毒發背胃熱

諸病邪熱盛故脈洪大熱在表而欲和惡正故惡寒熱入裏而欲和甚

之熱越故陽明病法多汗裏熱故作渴陽明主肌肉故肌熱脈洪交頰中

故目痛脈洪身重少陽日中屬太陽日晡屬陽明德寒

十五度平旦屬少陽日中屬太陽日晡屬陽明德寒

石膏一斤知母六兩甘草二兩粳米六合先煮石膏數升湯

熱湯成溫服

此足陽明手太陽藥也熱淫於內以苦發之故以知母苦寒為君熱則

傷氣必以甘寒為助故以石膏為臣石膏清而不味皆甘寒凡津液內燥

故以甘草粳米甘平益氣緩之為使不致傷胃也又煩出于肺躁出于

腎石膏清肺而瀉胃火知母清肺而瀉腎火甘草和中而瀉心脾之火

或瀉其子 或瀉其母 不常治陽明氣分熱也石膏甘草不但清裏

方可用或有血虛身熱脾虛發熱及陰盛格陽而赤煩燥類白虎湯症

誤投之不可救也按白虎症脈洪大有力類白虎症脈大而虛以此為

辨又按陰盛格陽陽盛格陰二症至為難辨陰盛格陽而格陽于外外

熱而內寒陽盛格陰而格陰于外外冷而內熱所謂重陰必陽重陽必

陰重寒則熱重熱則寒是也當于小便分之使清者外雖燥熱而中必

寒便赤者外雖厥冷而內實熱再看口中燥渴及舌胎淺深蓋舌為心

苗應南方火邪在表則未生胎和入裏津液搏結則上胎而滑胎白者

丹田有熱胸中有寒和在半表半裏也熱入漸深則燥而乾熱聚于胃

則黃宜示氣及白虎若熱病日乾舌黑乃腎水則于心火熱益張之病

篤矣然亦有胎黑屬寒者古無芒刺口有津液也又當用溫三之劑凡

宜細辨李東垣曰邪在陽明肺受火熱故用辛寒以清肺所以有白虎

之名白虎西方金神也與鶴泉曰如伏金之令行則夏水之炎退成氏

曰立效後不可服為大寒之劑易老曰有是病則投是藥苟拘于格而以指手皆以白虎為大寒承氣又何以行于冬合乎大陽發熱無汗而渴忌白虎表未解也陽明汗多而渴忌五苓猪苓津液大耗也

**本方加人參三兩名人參白虎湯**  
仲治傷寒渴欲飲水無表症者  
白虎

人參生補凡身發熱為熱在表渴欲飲水為熱在裏身熱飲水表裏俱有熱身涼不渴表裏俱無熱飲水者不可不與不可遇以恣飲則有水結胸心下悸喘咳痰喘亦治傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者

水結胸心下悸喘咳痰喘亦治傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者  
夫未全罷尚屬太陽然燥渴心煩為裏熱已熾與白虎湯解表相清裏熱加人參補氣生津太陽病在表故惡寒少陽在半表半裏亦微惡寒陽明在裏故不惡寒反惡熱問有惡寒者與大陽合病也許叔微曰仲景云傷寒吐下後七八日不解表裏俱熱大渴燥煩者白虎加入參

湯主之又云脈浮滑此表有熱裏有寒白虎加人參湯主之又云傷寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎林億校正謂于此表裏發熱謂不然大抵白虎能除陽中渴表裏發熱前後二症或云表裏發熱或云表熱裏寒皆可服之一種發熱無汗其亦治太陽中腸胃也身熱

表不解全足麻黃與葛根症安可行白虎也亦治火傷肺胃傳為肺汗出惡寒足冷脈微而渴身熱惡寒為在表足亦治火傷肺胃傳為肺

消以白虎湯治其氣分病不能除者之藥也本方加蒼朮名白虎加之

木湯治濕溫脈沉細者症雖冷腹滿頭身痛多汗渴而語李東垣

曰動而傷暑大熱傷氣辛苦之人多得之宜白虎蒼朮湯本方加桂枝

名桂枝白虎湯治溫瘧但熱無寒骨節疼痛時嘔本方加柴胡黃芩

半夏名柴胡石膏湯治暑嗽喘渴本方除粳米加人參名化斑湯治胃

熱發斑脈虛者

肺胃  
虛熱

竹葉石膏湯

治傷寒解後虛癰少氣氣逆欲吐傷寒解後餘熱未盡

氣虛熱上亦治傷暑發渴脈虛

竹葉石膏湯人參甘草二麥升半粳米升加薑煎

此手太陰足陽明藥也竹葉石膏之辛寒以散餘熱竹葉能止喘人參

甘草麥粳米之甘平以益肺安胃補虛生津半夏之辛溫以豁痰止

外實  
內實  
胃也  
戊土  
胃也  
火也

嘔故去熱而不損其真逆逆而能益其氣也

又方竹葉石膏木通薄荷桔梗甘草亦名竹葉石膏湯治胃實火盛而

作渴李士材曰陽明外實則用柴葛以解肌陽明內實則用承氣以攻

以桔梗救余薄荷升火乎上水通泄火乎下甘草石膏

升陽散火湯東垣治肌熱表熱四肢發熱骨體中熱熱如火燎捫之烙手

此病多因血虛得之及胃虛過食冷物抑遏陽氣于脾土並宜服此

四肢四肢熱仰五心煩燥也火性上行若鬱而不達則反以錯雜真陰

而服清筋骨皆為之熱也若飲食兩塞至陰則清陽不得上行故不能

傳化也柴胡八錢防風二錢葛根五分升麻一錢羌活一錢獨活一錢人參一錢白芍五錢炙甘

草三錢生甘草三錢每服五錢加薑棗煎

此手足少陽藥也柴胡以發少陽之火為君升葛以發陽明之火羌防

升陽散火湯

降  
瀉也

以發太陽之火獨活以發少陰之火為臣此皆味薄氣輕上行之藥所以升舉其陽使三焦暢達而火邪皆散矣人參甘草益脾土而瀉熱為藥瀉脾火而斂陰且酸飲甘緩散中有收不致有損陰氣為佐使也吳

臯曰經曰少火生氣天非此火不能生物人非此火不能有生陽之則先逆之則滅今為飲食抑遏則生道幾乎息矣使清陽出于上竅則濁陰自歸下數而飲食傳化無抑遏之患矣東垣聖子脾胃治之必主升陽俗醫即降而不知月是撲其少火也安望其衛生耶又曰古人用辛散者必用酸收故桂枝湯中亦用芍藥猶兵家之節制也

本方除人參獨活加葱白名火鬱湯治同

火鬱者內熱外寒脈沉而數火鬱無酸故外寒沉為在裏

沉而數知為內熱也

陶節庵升陽散火湯人參白朮茯神甘草陳皮麥冬當歸芍藥柴胡黃

芩加薑棗金器煎治傷寒又手背心跡衣襟尿瀝語昏沉不省人等症

曰俗醫不識誤認風症不知此乃肝熱承脾元氣虛衰不能主持者最宜症小便利者可治有痰加薑炒半夏火既降後服金器煎大黃

湯加白木升麻太陽虛故久手自臂其心熱昏其神故尋衣摸床小便  
利則肺氣猶降勝就猶能化氣而腎水未枯故可治昂按此病非升散  
之症方山建榮胡一朱建榮升  
散之名而師卷以此名方何歟

涼膈散方

治心火上盛中焦燥實煩躁口渴目赤頭眩口瘡唇裂吐血

衄血大小便秘諸風癰癰胃熱發斑發狂及小兒驚急瘰癧瘰癧皆上  
中上焦之火  
為之患也

連翹四兩大黃酒芒硝 廿五兩梔子炒黃芩酒薄荷一 為末每服三

錢加竹葉生薑煎

此上中二焦瀉火藥也熱淫于內治以鹹寒佐以苦甘故以連翹黃芩

竹葉薄荷升散于上而以大黃芒硝之猛利推瀉其中使上升下行而

膈目清矣用甘草生蜜者病在膈甘以緩之也李東垣曰易老法減大

胸膈與六經之藥以手足少陽俱下胸膈同相火游行一身之表乃至

高之分故用舟楫之劑浮而上之以去胸腹六經之熱也重病用煎方



枯梗  
為藥  
中舟  
楫

肝胆  
火

輕者用此方論嘉言曰按中風症大勢風水令君相二火主病古方用  
赤脂散居多如轉舌背用赤脂散加黃蒲遠志活命金丹用赤脂散加  
青黛蜜根滋風火上炎胸膈正境原之地所以清心寧神轉舌活命涼  
膈之功居多不可以宣通腸胃輕骨之也按轉舌背散心經之靈熱活  
命丹散肝經之鬱火也潘思敬曰仲景謂胃承氣湯後人一發加連翹  
梔子黃芩薄荷謂之涼膈散至河間又變加川芎歸芍白朮防風荆芥  
麻黃桔梗石膏滑石謂之防風  
通聖散是也古之複方也

當歸龍薈丸宜治一切肝胆之火神志不寧驚悸瘡癰躁擾狂越頭運

目眩耳鳴耳聾胸膈痞塞咽嗑不利腸胃躁澀兩脇痛引少腹肝移熱

于肺而咳嗽痰涎肺風水主筋主怒主驚故搖搖驚狂皆屬肝火目為肝

脉胃膈通喉嚨水衰火盛故膈咽不利兩脇少腹皆肝也肝經所循故亦

治盜汗歸大黃湯同意

當歸酒洗龍胆草酒洗梔子炒黃連炒黃柏炒黃芩兩一大黃酒洗南棗水蘆

薈五錢木香二錢麝香五分蜜丸薑湯下

此足厥陰手足少陽藥也肝水為生火之本肝火盛則諸經之火相忍而起為病不止一端矣故以龍胆青黛直入木經而折之而以大黃芩連梔柏通平上下三焦之火也黃芩清肝火黃連瀉心火黃柏瀉腎火大黃瀉脾火梔子瀉三焦火蘆薈大苦大寒氣臊入肝能引諸藥同入厥陰先平其甚者而諸經之火無不漸平矣諸藥苦寒甚極當歸辛溫能入厥陰和血而補陰故以為君少加木香麝香取其行氣通竅也然非實火不可輕投

肝經

龍胆瀉肝湯方

治肝熱經實火滿熱脇痛耳聾目赤筋痿陰汗陰

腫陰痛目濁淚血者肝經之官也謀慮出焉肝中正之官也決斷出焉

肝虛數謀慮而不能決肝氣上逆故口為之苦肝主筋熱勝故筋痿肝脈絡于目故淚血或肝火或肝虛皆肝火也

龍胆草酒炒黃芩酒炒梔子酒炒澤瀉 木通 車前子 當歸酒洗生地黃

柴胡 甘草生用

此方是肝火一經之藥當歸龍薈丸 龍胆瀉肝湯

辨火

左金丸

又名萊

治肝火燥盛左脇作痛吞酸吐酸筋散病結肝火盛則

肝子一為肝母也

口苦爪枯亦治前症

以加人參者扶上所以抑木用二冬五味者清金亦

車前加人參五味天冬麥黃連知母亦名龍胆瀉肝湯治筋痿瘰癧

所請在下者因兩端之生地龍胆苦寒以一方除當歸生地木通澤瀉

治前陰熱癰燥與此因飲酒風濕熱合于下焦為和厥陰肝脈絡于陰

緩中而不使傷胃為臣使也東垣無黃芩梔子甘草亦名龍胆瀉肝湯

之濕以佐之然皆苦寒下瀉之藥故用歸地以養血而補肝用甘草以

子清肺與三焦之熱以佐之澤瀉瀉腎經之濕木通車前瀉小腸膀胱

此足厥陰少陽藥也龍胆瀉厥陰之熱柴胡平少陽之熱黃芩梔

吐酸亦出肝火上于肺胃從木之化故酸厥陰之脈絡陰亦治噤口痢

湯藥入口即吐水方加糯米一撮煎服但得三匙下咽即不復吐矣

黃連六兩煎汁炒吳茱萸一兩鹽水炮水丸

此足厥陰藥也肝實則作痛心者肝之子實則瀉其子故用黃連瀉心

清火為君使火不劫金金能制木則肝平矣吳茱萸熱能入厥陰肝行

氣解鬱又能引熱下行故以為反佐一寒一熱與者正治熱者從治以

治熱從其性而反治故能相濟以立功也肝居于左肺處于右左金者謂使

金令得行于左而平肝也李東垣曰病機曰諸嘔吐酸皆屬于熱此上

甚則酸水投其心次令牙酸不能相對以為熱東垣以為寒何也丹溪曰吐

酸作熱攻之誤矣或問吞酸者問以為熱東垣以為寒何也丹溪曰吐

酸與吞酸不同吐酸吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣鬱而成積

胸中生熱故隨水化逆作酸味非熱而何其有鬱之久伏于腸胃之間

消不得上應不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心肌表溫煖

勝理開發或得香熱湯九津液得行亦可暫解非寒而何素問言熱言

其本也東垣言寒言其未也子皆治吞酸用黃連茱萸煎炒隨時令送

為作使若木茯苓為輔湯浸蒸餅為丸吞之仍教頻食蔬菓自養則病

身不痛

易安心藏氏曰房勞腎虛之人胸膈多有隱痛此腎虛不能納氣氣虛不能生血之故氣與血猶水也盛則流船虛則解有不滯者所以作痛宜破故紙之類和腎芎歸之類補血者作尋常痛治則和矣

本方加炒芩蘇陳皮亦名聚連丸治同本方加芍藥等分為丸名戊

己丸治熱痢熱瀉熱瀉者黃蘗肚痛也戊為胃土己為脾土本方除吳茱萸

加附子一兩名通附六一湯治胃腕痛寒因熱用也本方用黃連一味

吳茱萸湯浸一宿為丸名抑清丸入瀉肝火治左脇作痛單黃連煎服

名瀉心湯治心熱

瀉心丸錢治肝火鬱熱不能安卧多驚多怒筋痿不起目赤腫痛肝木

木盛生火故發熱多其于寅卯木肝之時按之在肉之下骨之上為肝

熱肝胆之經行于兩脇風火于之故附不安川在志為怒感多怒肝虛

則甚故多驚肝主筋遂熱則緩故按目為肝厥風熱發于目故腫痛

龍胆草 山梔 大黃 酒川芎 黃芩 羌活 防風 等分蜜丸竹

藥湯下

此足厥陰少陽藥也肝者將軍之官風淫火熾不易平也龍胆大黃苦寒味厚沉陰下行直入厥陰而散瀉之所以抑其怒而折之使下也羌活氣雄防風善散故能搜肝風而散肝火所以從其性而升之于上也少陽火鬱多煩躁厄子能散三焦鬱火而使和熱從小便下行少陽火實多頭痛目赤川芎能上行頭目而逐風邪且川芎當歸乃血分之藥能養肝血而潤肝燥血虛故肝燥肝又皆血中氣藥卒能散而溫能和兼以增之也一瀉一散一補同為平肝之劑故曰瀉青五藏之中惟肝常有餘散之即所以補之以木喜條達故也然必壯實之人方可施用

余子容曰時醫多執肝常有餘之說舉手便云平肝按聖濟經云原四時之所化始于木究十二經之所養始于春女子受胎一月是厥陰肝經養之肝者乃春陽發動之始萬物生化之源故戒怒養陽使先天之氣自生于無窮是攝生之切要也不可泥于前說昂按此說本之內經

六所藏象論曰所謂得五行時之勝各以氣命其藏求其勝也皆歸始  
春蓋春屬肝木乃吾身升生之氣此氣若有不充則四藏何所稟承如  
春無所生則夏長秋收冬藏者何物乎五行之中惟木有發榮暢茂之  
象水火金土皆無是也花葉萌發而可愛結實成實食之以全生  
皆此木也使天地而無木則世界黝冥其無色矣由是言之培之養之  
尤恐不暇而尚欲剪之伐之乎故養血和肝使火不上炎則心氣和平  
而百骸皆理不特養身之要道亦養德之切務也昂又按世醫多云肝  
有渴無補不知六味地黃丸七寶美壽丹等劑皆補肝之藥也人特習  
而不察耳外毫秘要曰五行五藏皆互相生肝雖處中而為藏首位在  
甲乙懷柔懷仁故應春而生也為心之母餘藏循次而生焉心為主主  
神四藏為四鄰四鄰有憂王必懷憂四鄰和平則王有悅悅則營衛不  
錯髮則經絡患生心不受邪所病者惟憂憂能制也肺為風府呼吸之  
門諸藏紋亂氣息皆形誰能出不出戶肝若風熱盛心憂則頭痛過憂  
則心煩寒盛必熱熱盛必寒倚伏之道也但平風熱抑狂邪而營衛自  
然通泰矣

然通泰矣

脾火

黃散

治脾胃伏火口燥唇乾口瘡口臭煩渴易飢熱在肌肉口為脾

脾之外候口燥唇乾口臭口臭皆屬脾火脾熱故煩渴易飢病者名中  
消脾主肌肉故熱在肉分輕按重按皆不熱不熱不重乃得之週夜尤  
甚者為脾熱實熱宜此湯及調胃承氣湯熱宜補中益氣湯。按而上  
然身前按身溫熱任而妄言妄見皆足陽明胃火也及足外廉腹腹後

熱足太勝口熱而乾中熱而喘足下熱而痛皆足少陰局上熱而  
扳耳前熱若寒皆手太陽身熱而痛手少陰酒折寒熱手太陰掌中熱  
手太陰少陰厥陰熱而筋縱不收陰痿足陽明厥陰又曰胃居膈上胃  
熱則膈以上熱腸居膈下腸熱則膈以下熱肝居膈肝熱則膈藥  
熱肺居膈背肺熱則胸背木熱腎  
居腰腎熱則腰亦熱可類推也

防風四錢 薑七錢 山一兩 石五錢 甘草二錢 右末微炒香蜜酒調服

此足太陰陽明藥也山巵清心肺之火使屈曲下行從小便出養腎理

脾肺之氣去上焦壅熱辟惡調中石膏大寒濕熱兼能解肌甘草甘

和中又能瀉火重用防風者取其升陽能解脾中伏火又能于土中

木也木盛壯土防風能散肝火吳鶴皋曰或問脾中伏火何以不用黃連余曰按吳又問既惡燥何以用防風余曰東垣有言防風乃風

藥中潤劑也李東垣曰瀉黃散非瀉脾也脾中為肺也實則瀉其子以脾為生肺之上親故用石膏厄子之類

錢乙瀉黃散自正防風升麻枳殼黃芩各錢半 石斛一分 半夏一分 甘草七分

治同前症或唇口皸燥脾之華在唇動也風也皸裂火也白芷升麻皆屬陽明藥防風祛風而散脾火燥在



胃火牙痛

而寒者為陽明經氣不足

能燥能潤發表開鬱古術清脾平胃退熱補虛甘草和脾兼能治火亦火機發之之義也治口病諸藥脾熱則口甘生地芍藥黃連瀉火神機葉龍消食健肝熱則口酸黃連龍胆瀉肝心熱則口苦柴胡龍胆黃芩黃連瀉火肺熱則口辛黃芩芩子瀉肺芍藥瀉脾冬清心腎熱則口鹹知母烏賊骨淡竹胃熱則口淡茯苓白朮牛黃生薑煨脾勝濕口黃黃芩瀉火葛根生津防風薄荷疎風瓜蒌茯苓行痰

清胃散

治胃有積熱上下牙痛牽引頭腦滿而發熱其牙喜寒孫熱

或牙齦潰爛或牙宣出血或唇口頰腮腫痛足陽明胃脈循鼻外入上

耳前主上牙齦喜寒飲而惡熱手陽明太陽脈上頰貫頰入下齒伏口主下牙齦喜熱飲而惡寒足陽明別絡腦故腦痛陽明之脈貫手而故而熱二經熱盛故唇口齒頰病而腫痛也齒為骨屬腎牙宣牙齦出血或齒縫出血也亦名齒齦乃腎病若血多而湧出不止為陽明熱盛以陽明多氣多血也唇屬脾胃火屬熱燥則乾熱則裂風則動寒則枯唇反者肉先死

生地黃 牡丹皮 黃連 當歸 升麻 一方加石膏

胃中  
濕熱

甘露飲方

治胃中濕熱口臭喉痛齒齦宣露及吐衄齒血

胃之竅在口其脈上齒候

身濕熱內盛故口臭口瘡腸熱拂鬱胃中越出干口鼻故吐血衄齒齦

屬少陰腎經屬陽明胃二經有熱則齒齦齒縫出血名齒齦或牙齦腫脫齒離宜露也

升陽明之清陽消升熱降則腫消而痛止矣

毒新甫曰濕熱盛而牙痛者承氣湯輕者薄荷散大

腸熱而經腫痛者薄荷散甚者調胃湯六經而痛者越散九中氣虛而

痛者補中益氣湯思慮傷脾而痛者歸脾湯腎經虛熱而痛者六味丸

腎經虛寒而痛者還少丹重則方味北其屬風熱者獨活散齒齦陳散風

寒人腦者羌活附子湯當臨時制宜附獨活散獨活羌活川芎防風各

五錢細辛剉芥薄荷生

地各二錢每服三錢

生地黃 熟地黃 天冬 麥冬 石斛 茵陳 黃芩 枳殼 枇

杷葉 甘草 等分每服五錢一方加桂苓名桂苓甘露飲本方加

諸方集解

卷之四

甘露飲

七

犀角云如此甚有道理犀角凉心清肝

此足陽明少陰藥也煩熱多屬于虛一地二冬甘草石斛之甘治腎胃之虛熱瀉而兼補也茵陳黃芩之苦藥折熱而去濕火熱上行爲患故又以枳殼枇杷葉抑而降之也

河間桂苓甘露飲滑石四兩石膏寒水石甘草各二兩白朮茯苓澤瀉各一兩

猪苓肉桂各五錢每服五錢治中暑受濕引飲過多頭痛煩渴濕熱便秘

此亦五苓六一之令張子和去猪苓減三石一半加入參乾葛各一兩

香五錢木香一分每服三錢亦名桂苓甘露飲治伏暑煩渴脉虛水逆飲水

水入即吐

肺大

治肺火皮膚蒸熱酒漸寒熱自肺元氣喘氣急皮膚蒸熱

也酒漸寒熱邪在膚腠也口腫尤甚金旺于酉也肺苦氣上逆故

桑白皮

地骨皮

錢甘草

分五粒

易老加黃連

此手太陰藥也

桑白皮甘草益元氣之不足辛瀉肺氣之有餘除痰止咳

性善行水瀉火故能

地骨皮寒瀉肺中之伏火淡泄肝腎之虛熱涼血

除痰痰除則嗽止

退蒸金腎為肺子實則瀉其子甘草瀉火而益脾粳米清肺而補胃

金母虛則

重能瀉熱從小便出肺主西方故曰瀉白李時珍曰此瀉肺

瀉白散瀉肺經氣分之火黃芩一物湯丹溪黃芩

治咳嗽喘急嘔

本方加人參五味茯苓青皮陳皮亦名加減瀉白散

東垣治咳嗽喘急嘔

吐本方加知母黃芩桔梗青皮陳皮亦名加減瀉白散

煩熱口渴胸膈不利本方除甘草粳米加黃芩知母麥冬五味桔梗亦

名加減瀉白散

治過飲傷肺氣出腥臭唾涕稠粘嗑喉不利口苦

乾燥

治氣出腥臭清而利氣為臣五味酸溫以收肺氣麥冬苦寒

導赤散

五

心火  
腸火

治唾溫稠枯口苦乾燥為佐枯梗  
辛涕輕浮治痰逆利咽膈為使也

導赤散錢

治小腸有火便赤淋痛面赤狂躁口糜舌瘡咬牙口渴心火與小腸

相表裏心熱則小腸亦熱故便赤淋痛心屬君火是五藏六府火之主  
故諸經之熱皆應于心而赤頰腫咬牙口滿皆為心熱也舌為心苗若  
心火上炎蒸蒸子口則口糜舌瘡輕手按至皮季之下肌肉之主則熱  
日中尤甚是熱在血脈為心熱。朱丹溪曰五藏各有火五志激之其  
火隨起若諸寒病必身犯寒氣口  
食寒物非若諸火病自內作者

生地黃 木通 甘草梢 淡竹葉 等分煎

此手少陰太陽藥也。生地涼心血。竹葉清心氣。葉生竹上木通降心火

入小腸。君火宜木通。相火宜澤瀉。竹木雖甘草梢達莖中而止痛。便赤以

其導丙丁之火由小水而出也。上腸為丙火。心為丁火。心熱泄小腸。金

散治口糜神効。經曰膀胱移熱于小腸。膀胱不使上為口糜。亦有理。中湯加附子者。因脾胃虛衰之火。被遏上炎。故用參朮甘草補其上。再

附散其寒。則火得所助。接引退舍矣。綱目曰心氣  
熱則上竅宜導赤散。氣虛下。其地黃九。

心火  
淋濁

蓮子清心飲局方

治憂思抑鬱發熱煩躁或酒食過度火盛冠金口苦咽

乾漸成消渴遺精淋濁遇老即發四肢倦怠五心煩熱夜靜聲甚及女

人崩帶

煩躁遺精淋濁者心虛而有熱也心火妄動則不能下交于腎故元精失守也遇勞則發為勞淋勞則動其心火也晝偏熱者

陽虛也崩中由損傷衝任氣血俱虛經曰陰虛陽搏調之崩由陰虛而陽搏之血得熱而妄行也帶者病本于帶脉而得各赤屬血白屬氣由陰虛陽竭榮氣不升衛氣下陷或濕痰濕熱蘊積而下流也

石蓮肉

人參 黃耆 茯苓 柴胡錢黃芩炒 地骨皮 麥冬 車

前子

甘草炙二錢 空心服

此手足少陰足少陽太陰藥也參耆甘草所以補陽虛而瀉火

草瀉火

助氣化而達州都膀胱也氣化則能出地腎之虛熱柴胡散肝胆

之火和黃芩麥冬清熱于心肺上焦茯苓車前利濕于膀胱下部中以

石蓮清心火而交心腎則諸症悉退也

傷寒心熱

導赤各半湯節

治傷寒後心下不硬腹中不滿二便如紫身無寒熱漸

變神昏不語或睡中獨語目赤口乾不飲水與粥則嘔不與勿思形如

醉人名越經症

傷寒不硬不滿二便如常病不在府也神昏睡語不思食形如醉人此邪熱傳手少陰心心火上而通肺也邪

熱入裏故目赤舌乾邪熱在陰故不渴此症自定而傳手經故曰越經

黃連 黃芩 犀角 知母 山梔 滑石 麥冬 人參 甘草

一茯神 加燈心 薑棗煎

此手少陰太陰太陽藥也陳來章曰熱入心經涼之以黃連犀角梔子

心移熱于小腸泄之以滑石甘草燈心心熱上通于肺清之以黃芩梔

子麥冬然邪之越經而傳于心者以心神未不足也故又加人參茯神

以補之

昂按傷寒傳邪手足原無界限故仲景亦有瀉心數湯而麻黃桂枝先正以為皆肺藥也此湯瀉心肺之邪熱從小腸膀胱由

故亦曰導赤其與瀉心異者以無痞澀之症也

普濟消毒飲

治大頭天行初覺憎寒體重次傳頭面腫成目不能開

上喘咽喉不利口渴舌燥

俗云大頭天行親戚不相訪問染者多不救

稍緩翌日如故下之又緩終莫能愈漸至危為東垣視之曰夫身半以上天之氣也身半以下地之氣也此邪熱客于心肺之間上攻頭面為腫盛以承氣瀉胃中之實熱是為謀代無過病以適至其所為故遠處此方全活甚衆遂名普濟消毒飲于

黃芩

酒炒黃連酒炒陳皮白甘草用生玄參連翹板藍根馬勃鼠

粘子

薄荷錢僵蚕升麻分柴胡桔梗二為末湯調時服之

或蜜拌為丸噙化一方無薄荷有人參三錢亦有加大黃治便秘者或

酒浸或煨用

此手太陰少陰足少陽陽明藥也蒼連苦寒瀉心肺之熱為君玄參苦

寒橘紅苦辛甘草甘寒瀉火補氣為臣連翹薄荷鼠粘辛苦而平藍根

甘寒馬勃鼠粘苦平散腫消毒定喘為佐升麻柴胡苦平行少陽陽明

甘寒馬勃鼠粘苦平散腫消毒定喘為佐升麻柴胡苦平行少陽陽明



二經之陽氣不得伸指梗辛溫為舟楫不令下行為載也此解本之東

潤然平書中無此方見于準繩

風虛頭

清震湯

治雷頭風頭面疙痞腫痛憎寒壯熱狀如傷寒一云頭如雷

也李東垣曰病在三陽不可過用寒藥直刺諸穴無過處清震湯治之  
○三陽之氣皆會于頭額從額至額絡腦後者屬太陽從額至鼻下面  
者屬陽明從頭角下耳  
中耳之前後者屬少陽

升麻

蒼朮五錢荷葉二枚

此足陽明藥也升麻性陽味甘氣升能解百毒蒼朮辛烈燥濕強脾能

辟癰瘍此局方升麻湯也荷葉色青氣香形仰象震震仰盂為雷也能

助胃中清陽上行用甘溫辛散藥以升發之使其邪從上越且固胃氣

使邪不傳裏也

一切

紫雪局

治內外煩熱不解狂易躁走發熱黃口瘡脚氣瘡毒蟲熱

毒藥毒及小兒驚癇

黃金石藥水石 石膏 滑石 磁石水煮三斤搗煎去渣入後藥升麻 玄參

甘草炙半斤 犀角 羚羊角 沉香 木香五兩丁香一兩並搗剉入前藥

朴硝 硝石各二斤提淨入前藥汁中微火煎不住辰砂三兩研細麝香當

門子一兩二錢研細 合成退火氣冷水調服每一二錢 本方無

黃金

此手足少陰足厥陰陽明藥也寒水石石膏滑石硝石以瀉諸經之火而兼利水為君磁石玄參以滋腎水而兼補陰為臣犀角羚羊角以清心寧肝升麻甘草以升陽解游沉香木香丁香以溫胃調氣麝香以透骨通竅升麻黃金以鎮驚安魂瀉心肝之熱為佐使諸藥用氣稍獨用質者以其水固結成性峻而易消以瀉火而散結也

午前  
虛熱

醫方集解

卷五

七

人參清肌散

治午前潮熱氣虛無汗熱發午前陽也而陰火乘之也火

身熱無汗陰氣有餘為多汗身寒陰陽有餘則無汗而寒按此有餘乃病邪有餘即不足也陰陽和則無病過中則皆病也經又曰陽盛生外熱陰盛生內寒皆亢則為害非真陰真陽盛也

人參 白朮 茯苓 甘草 半夏 夏曲 當歸 赤芍藥 柴胡 乾

薑 加薑棗煎

此是少陽陽明藥也四君以補陽虛參朮歸芍以調陰血半夏和胃而

行痰柴葛升陽而退熱血以甘溫瀉火甘溫能退大熱酸寒活血也辛甘解

肌有汗宜實表無汗宜解肌此之無汗與傷寒無汗不同故但解其肌熱而不必發

出其汗也

前藥各一兩加黃芩五錢每服三錢加薑棗煎名人參散治和熱

客于經絡痰嗽煩熱頭痛目昏盜汗倦忘一切血熱虛勞喻嘉言曰此

午後發熱

絡未深入藏府雖用柴葛之類全藉參朮之力以達其邪又恐邪入痰  
隨用茯苓半夏兼動其痰合之當歸赤芍黃芩並治其血中之熱止用  
三錢為劑蓋方咸知約庶敢用柴胡  
乾葛可此叔微一種苦心特為發之

白朮除濕湯

治午後發熱背惡風四肢沉困小便色黃又治汗後發

熱午後發熱熱在陰分陽陷陰中也背為陽腹為陰皆惡風者陽不足  
幸也脾主四肢四肢沉困濕熱而脾不運也小便黃濕兼熱也汗後而  
熱不退  
陽虛也

人參 赤茯苓 甘草 柴胡 白朮 生地黄 地骨皮 知母

澤瀉 每服五錢如有刺痛加當歸七錢小便利減芩瀉一半

此足太陰少陰少陽藥也陽陷陰中熱在血分故以生地滋其少陰而

以知母地骨瀉血中之伏火也柴胡升陽以解其肌

陽陷陰中故以柴胡提出其陽

瀉利濕兼清其熱參朮甘草益氣助脾氣足陽升虛熱自退脾運而濕

亦除矣

方名除濕而治在退熱欲熱從濕中而下降也

腎蒸

清骨散

治骨蒸勞熱

火炎水竭真陰銷燬故肌骨之間蒸蒸而熱也。李東垣曰書熱夜靜者是陽氣旺于陽分也書靜

夜熱者是陽氣下陷入陰中也名曰熱入而室蓋然夜熱是重陽無陰也當亟瀉其陽蟬補其陰書病則在氣夜病則在血

銀柴胡 錢胡黃連

秦艽

鱉甲

童便炙

地骨皮

青蒿

知母

錢甘草

分炙五

此足少陽厥陰藥也地骨皮黃連知母之苦寒能除陰分之熱而平之于內柴胡青蒿秦艽之辛寒能除肝胆之熱而散于表鱉陰類而甲屬骨能引諸藥入骨而補陰甘草甘平能和諸藥而退虛熱也

石膏散

外聖

治勞熱骨蒸四肢微痠有汗脉長者

勞熱之症不盡屬陰虛亦有陽邪入裏傳為骨

蒸令人先寒後熱漸成羸瘦者有汗胃實也脉長陽明症也

石膏

研細每夕新汲水服方寸匕取熱退為度

此足陽明藥也石膏大寒質重能入裏降火味辛氣輕能透表解肌雖

寒而甘能緩脾益氣火勞有實熱者非此不為功故外臺秘要明醫然

皆載之

玄味曰五行六氣水持其一再一水既虧豈能勝五火哉醫不

知和氣未除便用補劑和氣得補遂入經絡至死不悟去涼劑  
能清火養陰熱劑能補火燥水理易明也勢為熱症明矣尚可補乎惟  
無熱無積之人脈微無力方可補之必察其胃中及右腎二火果虧後  
用補劑可也證治要訣云治虛勞用熱藥者猶釜中無水而進  
火也過用冷藥者猶釜下無火而添水也非徒無益而反害之

二母散

治肺勞有熱不能服補氣之劑者肺虛挾火咳嗽發熱陰虛  
已甚再服補陽之藥則火益

亢而陰愈虧故有雖病  
虛勞不能服溫補藥者

知母

炒 貝母 炒

等分為末服

古方二母各一兩加巴霜十粒薑三

片臨臥白湯嚼服治咳嗽痰喘必利下寒痰

此手太陰藥也火旺鑠金肺虛勞熱能受溫補者易治不能受溫補者

難治故又設此法以滋陰用貝母化痰瀉肺火知母滋腎清肺金取其

苦能泄熱寒能勝熱潤能去燥也

二母皆潤  
燥之藥

咽痛

利肺湯本

治肺火熱虛煩上壅咽痛生瘡十二經脈惟足太陽在表

微喉嚨腫痛或實熱上攻或虛火妄行痰涎結聚則成咽痛咽痛者火  
宜升之散之若虛火宜用人參黃耆附子辛熱之藥多有過服寒家而病反  
甚者張子和曰經何以言一陰一陽結為喉痺蓋君相二火獨勝則熱  
結正絡故痛且速也臨乾益痛咽腫腫者水強皆君火也惟喉痺急  
速相火也君火入  
火也相火龍火也

薄荷 荊芥 防風 桔梗 甘草 牛蒡子炒 人參 等分或為末

每服二錢或加薑棗其氣清化能散相火逆結之痰

此手太陰少陰藥也咽痛咽瘡由于火鬱桔梗甘草甘桔湯也辛苦散

寒甘平除熱為清肺利咽之要藥加薄荷荊芥防風以散火除風加牛

蒡子以潤腸解毒火者元氣之賊正氣虛則火熾故又加人參以補

虛退熱喻氏曰此方清上焦熱全用辛涼輕清之味不用苦寒下降之藥較涼膈散更勝

甘桔湯金匱名 治少陰咽痛喉痺肺腫上膈乾咳無痰火鬱在肺手少

厥快咽足少陰腎脉循喉嚨火喘則肺經曰一陰一陽結為之喉痺一陰少陰君火二陽少陽相火也肺經者金經云熱之所過血為之凝滯畜結癰膿吐如米粥始萌可救膿成難治火鬱在肺則乾咳無痰亦治心藏發咳咳則心痛喉中介介如梗狀

甘草二桔梗一 或等分王好古加法失音加訶子聲不出加半夏上

氣加陳皮涎嗽加知母貝母欬湯加五味酒毒加葛根少氣加入參嘔

加半夏生薑吐膿血加紫苑肺病加阿膠胸膈不利加枳殼痞滿加枳

實白朮加梔子大黃面腫加茯苓疔痛加黃芩發斑加荆芥防風痰火

加牛蒡子大黃不得眠加梔子 昂按觀海藏之所加而用藥之大要亦可識矣

此手太陰少陰藥也甘草甘平解毒而瀉火桔梗苦辛清肺而利弱又

能開提血氣表散寒邪排膿血而補內瀉故治咽痛喉痺肺癰咳嗽取

其辛苦散寒甘平除熱也 金匱曰咳而胸滿振寒嘔乾不渴時出濁唾腥臭為肺癰此湯主之喻加言曰此上從之



法乘其新起提其敗血或從唾出或從便出足以殺其毒此因胸滿振  
寒不渴病尚在表用此開提肺氣若勢已入裏又當引之從胃入腸此  
法不中用矣綱目曰喉痺惡寒為寒閉于外熱鬱于內忌用四時發寒  
等劑熱喉使陽鬱不得伸又忌用黃芩等寒劑下之使陽鬱更宜用表  
藥提其氣升以助陽也如不惡寒脈滑實者又當用寒劑下之發劑收  
之也○外臺秘要曰五藏之勞心雖為主而肺居其上肺為華蓋下覆  
四藏合天之德通達風氣性愛溫而惡寒心火更炎上蒸其肺金被火  
傷則葉萎倚着于肝肝發癢則嗽因心肝虛弱不能傳陽于下焦遂至  
正陽俱病變成嗽矣肺主皮毛遇寒則慄而栗起肺嗽因痿依着于  
肝而成病由木能扣金與鳴也先養肺抑心肝虛熱和其腎則愈矣

本方除桔梗名甘草湯

金匱

治同本方加防風名甘桔防風湯治同本方

加防風荆芥連翹名如聖湯

宋仁宗

治上焦風熱本方加連翹薄荷葉

梔子黃芩名桔梗湯

治上焦熱喉痺熱腫又方桔梗桑皮貝母瓜蒌

當歸枳殼杏仁防已

一作防風

黃耆

各五分

各七

杏仁

百合

甘草

各三

加薑煎亦

名桔梗湯

治肺癰

吐膿

乾多

渴如

大便閉

加大黃

小便赤

加木通

本方加訶子名訶子清音湯加葶便服治中風不語

肺屬金主音

金空

則有聲

風痰壅塞

本方

清咽散

則不能言詞子飲肺清痰散逆破結利肺氣甘草和元氣通便降  
火潤肺或加水通以利機竅也口足少陰腎脈候舌本足太陰脾連  
舌本手少陰心別脈繫舌本三經虛則痰涎壅其脈道舌不轉運而下  
能言或三脈亡血舌無血榮養而瘡舌瘡者中風不能轉運之類而喉  
候音聲如故喉痛者勞嗽失音之類而舌本則能轉運言語也本方除  
痞塞噎氣吐酸或欬傷寒應發汗反下之遂成痞積實理中丸最良  
知是痞先用枳桔湯尤妙  
緣結梗枳殼行氣下高也

玄參升麻湯

治發斑咽痛

發斑者陽明胃熱也  
咽痛者少陰相火也

玄參 升麻 甘草 等分

此足陽明少陰藥也升麻能入陽明升陽而解毒玄參能入少陰壯水  
以制火甘草甘平能散能和故上可以利咽而內可以散斑也

本方除玄參加犀角射干黃芩人參各陽毒升麻湯治陽毒發斑頭項  
背痛狂燥罵詈咽腫吐血溫服取汗

散

清斑青黛飲

治傷寒熱邪傳裏裏實表虛陽毒發斑

血熱不散

如疹子重者錦紋紫黑者熱極而胃竭也多死此或因陽症誤投寒藥或因下早表熱未虛六腑或因下遲熱留胃中皆發斑。斑症有六曰傷寒發斑或下早或下遲也。因溫毒發斑冬令感寒至春始發也。因熱病發斑冬令感寒至夏乃發也。因時氣發斑天疫時行之氣也。治諸相傳曰內傷發斑先因傷暑次食涼物通其暑火浮游于表也。宜加香薷扁豆曰陰症發斑元氣大虛寒伏于下通其無根失守之火上獨薰肺傳于皮膚淡紅而稀少也。宜大建中湯誤投寒藥則始矣。

青黛 黃連 犀角 石膏 知母 玄參 梔子 生地黃 柴胡

人參 甘草 加薑棗煎人苦酒一匙和服大便實者去人參加

大黃

此是陽明藥也發斑雖出胃熱亦諸經之火有以助之青黛黃連以清肝火梔子以清心肺之火玄參知母生地以清腎火犀角石膏以清胃火此皆大寒而能解鬱熱之毒者引以柴胡使達肌表柴胡清少便以

薑棗以和營衛其用人參甘草者以和胃也胃虛故熱毒乘風入裏而發于肌肉也加苦酒者其酸收之義乎

玉屑無憂散

陳無擇

治癰喉風痺咽喉腫痛咽物有碍或風涎壅滯口舌

生瘡大人酒癪小兒疳疔及骨屑哽塞

玄參 黃連 荊芥 貫衆 山豆根 茯苓 甘草 砂仁 滑石

錢礪砂 寒水石錢三 爲末每一錢先挑入口徐以清水咽下能除三

尸去八邪辟瘟療渴礪砂玄參最能生津凡渴大利水之藥皆能療渴

此足陽明少陰藥也玄參黃連寒水石清火貫衆山豆根解毒滑石茯苓利水砂仁礪砂軟堅並能清骨哽荊芥散結甘草和中故能統治諸症也

朱丹溪曰咽喉必用荊芥虛火上炎必用玄參又有陰氣大虛虛火游行無制客於咽喉連成咽痛脈必浮大重取必滿宜濃煎人參湯細細咽之如川清

降之藥立斃

然病

香連丸

治下痢赤白膿血相雜裏急後重

濕熱之積于血分則赤

者氣血俱病也後重裏急者氣滯不通也按裏急後重有因火熱者

有因氣滯者有因積滯者有因氣虛者有因血虛者當審察論治

黃連二十兩與葉更十香連四兩醋糊丸米飲下一方等分蜜丸

一方加甘草八兩黃連用滾水拌蒸晒九次入木香為丸

此手足陽明藥也痢為飲食不節與暑所傷濕熱蒸鬱而成黃連苦燥

濕寒勝熱直折心脾之火故以為君用吳茱同炒者取其能利大腸壅

氣病乃厥病且以殺大寒之性也裏急出于氣滯木香辛行氣溫和平

能通利三焦泄肺以平肝使木邪不尅脾土氣行而滯亦去也一寒一

熱一陰一陽有相濟之妙經所謂熱因寒用也痢疾初起忌用為黃連

或言下痢白為寒者誤也寒則不能消熱何山及化為膿也燥熱為白

然病

屬肺金也泄痢皆兼於濕濕熱甚于腸胃之內致氣液不得宜通使煩

渴不止也下痢赤白俗言寒熱相兼其說尤誤寒熱異氣豈能俱甚于

腸胃而何為利乎各隨五臟之經而見其色其本則一出于機且分

則一出子熱但分淺深而已或曰何故服辛熱之藥亦有愈者曰為能  
開發鬱結使氣液宜通流濕潤燥氣抑而已真若用辛苦寒之藥微加  
辛熱佐之如錢氏  
香連丸之類是也

本方加石蓮肉治噤口痢本方倍大黃治積滯本方加吳茱萸肉

豆寇烏梅湯丸本方加訶子龍骨名黃連丸治痢疾斷下石蓮清

胃口大黃傷胃熱渴積滯吳茱萸利藥

白頭翁湯治傷寒熱痢下重欲飲水者此傷寒轉痢之症也仲景見

渴但津乾欲飲水足陰分為大所灼欲得寒以解之也不可過與利與痢

不同利者渴也陰熱之利與陰寒不同陰利宜溫中四逆溫藥陽利其

色必鮮黃熱臭出作膿噴下必熱得寒藥則

止厚病式曰瀉白為寒赤黃紅黑皆為熱也

白頭翁二秦皮黃連黃柏三  
此足陽明少陰厥陰藥也白頭翁苦寒能入陽明血分而涼血止癖秦

皮苦寒性瀉能涼肝益腎而固下焦積水色青故黃連涼心清肝黃柏

腎熱 耳鳴 心寄 驚悸 耳聾 夢寐 之中 能開

寫火補水並能燥濕止利而厚腸取其寒能勝熱苦能堅腎滿能斷下

也成無已曰腎欲堅急食苦以堅之利則下焦虛故以純苦之劑堅之

傷則血熱後重而不用調氣之藥病不在氣耳周陽後曰和博厥陰

少陽其表也藏府相連于法禁下故但謀去其熱然除而何自止矣

腎熱湯下 治腎熱耳流膿血不聞人聲耳為腎竅舌為心竅以舌非孔

除足太陰手厥陰其經十經皆入絡耳中腎治內之陰心治外之陽清

淨精神之氣上走空竅而聽斯聰矣若二經不調陰陽不和或煩勞陰

虛或衛氣不下循經脈或得于風邪或經氣凝結或大怒氣逆或濕飲

瘡或熱聚不散流注膿血或風邪搏結成核寒耳皆令暴聾宜通耳

腎之劑 磁石煅紅澤土煅鹽水煮白朮炒五 麥 芍藥四甘草兩一生地黃汁

葱白 大棗十五 分三服 此足少陰藥也磁石體重辛鹹色黑補腎熱通耳明目故以為君牡

蠣鹹寒軟癭破結生地大寒瀉火滋腎麥冬甘草補肺清金 肺為腎母

玉太僕曰肺虛則少氣下能親息而耳聾白芍酸寒平肝和血經曰肝病氣逆則耳聾不皆

能生水而制火退熱而飲陰白朮甘草大棗補脾之品益土氣正以制

腎和也上能防水變曰頭痛耳鳴數者皆固本之藥使精氣充足和熱

自退耳竅自通加葱白者以引腎氣上通于耳也

辛夷散氏治鼻生瘰肉氣患不通不問香臭鼻為肺竅氣清則鼻通氣

肺間則生息肉筋脈地得熱而生芝青也

辛夷 白芷 升麻 藁本 防風 川芎 細辛 木通 甘草

等分為末每服三錢茶調下外川燒礬為末加礬砂少許吹鼻中能消化之

此手太陰足陽明藥也經曰天氣通于肺若腸胃無痰火積熱則平常

上升皆清氣也由燥火內焚風寒外束血氣壅滯故鼻生瘰肉而竅窒

不通也辛夷升麻白芷辛溫輕浮能引胃中清氣上行頭腦防風藁本



風熱  
鼻淵

蒼耳散

治鼻淵

鼻淵者鼻流濁涕不止口鼻乾燥乃風熱燥火下移也經

根辛溫酸痛也原病之目如以火燉金熱極則反化為水肝熱甚則出  
泣心熱甚則出汗脾熱甚則出涎肺熱甚則出涕腎熱甚則出唾皆火  
熱盛極筋癰  
以致之也

白芷

辛夷

蒼耳子

錢半

為末食前葱茶湯調下二錢

此手太陰足陽明藥也凡頭面之疾皆由清陽不升濁陰逆上所致白  
芷主手足陽明上行頭面通竅表汗除濕散風辛夷通九竅散風熱能  
助胃中清陽上行頭腦蒼耳疎風散濕上通腦項外達皮膚竭衛泄肺



半夏二錢陳皮去白茯苓一錢甘草五分加蘇煎蘇能製半夏之毒○陳皮

之患故治痰通用二陳風痰加南星白附皂角竹瀝寒痰加半夏薑汁

火痰加石膏青黛濕痰加蒼朮白朮燥痰加栝實杏仁食痰加山豆豉

芽神麴老痰加枳實海石芒硝氣痰加香附枳殼脇痰在皮裏膜外加

白芥子四肢痰加竹瀝

此足太陰陽明藥也半夏辛溫體滑性燥行水利痰為君痰因氣滯氣

順則痰降故以橘紅利氣痰由濕生濕去則痰消故以茯苓滲濕為臣

中不和則痰涎聚又以甘草和中補土為佐也經曰有痰而渴宜去半

夏曰渴而喜飲水者易之渴而不能飲水者難治宜半夏也此濕為

本熱為標濕極而兼勝已之化非真象也按貝母寒潤主肺家燥痰半

夏溫燥主脾家濕痰雖似化痰而寒溫燥潤各異故或誤施貽害匪淺

用者宜審之○有血不足陰火上逆肺家受火而清之令不得下行由

是津液渾濁生痰不生血者名燥痰當用潤劑如地黃門冬枸杞之類

滋陰降火而痰自清若撥二陳立見危殆有痰飲諸入四肢肩背腹痛

手足罷軟誤以爲風則非其治宜導痰湯加木香黃大凡痰飲發生諸症當以治飲爲先飲消則諸症自愈如頭風肩痠骨痛投以風藥不効投以痰藥見功又如眼赤羞明與之涼藥不効以痰劑投之凡此之類不一而足有人患歲吐痰滿地不甚稠粘只是沫多此氣虛不能攝涎不可用利藥宜六君子加益智仁一錢以攝之

本方加人參白朮名六君子湯治氣虛有痰本方去茯苓甘草名陳皮半夏湯再加桔梗名桔梗半夏湯本方去陳皮甘草名半夏湯再加生薑名小半夏加茯苓湯並治水氣嘔惡本方加黃芩名茯苓半夏湯治熱痰本方加黃連梔子生薑名三陳加梔連生薑湯治膈上熱痰令人嘔吐去生薑治嘔雜本方加砂仁枳殼名砂枳二陳湯行痰利氣本方加胆星枳實名通痰湯治頑痰膠固非一陳所能除者星以助半夏加枳實以再加黃芩治驚悸健忘怔忡不寐導痰湯加木香香成術治倒辟之功

附名順氣導痰湯治痰結胸滿喘咳上氣本方加枳實桔梗服子山查

神麴治食積痰嗽發熱本方加蒼朮枳殼片子薑黃名加味二陳湯  
 治痰攻眼腫併爛家手臂重麻木本方除甘草加乾薑薑汁糊丸名  
 溫中化痰湯治胸膈寒痰不快本方除茯苓甘草加黃連麵糊丸名  
 湯下名三聖丸治痰火嘔雜心懸如飢單用陳皮生薑名橘皮湯治  
 乾嘔噦及手足厥者單用生薑薑汁名生薑湯治似喘不喘似  
 嘔不嘔似噦不噦心中憤憤然無奈者本方半夏醋洗除陳皮薑汁丸  
 名消暑丸見前

潤下丸即二治胸中痰飲

廣陳皮去白八兩甘草二兩蒸餅糊丸或將陳皮鹽水煮爛晒乾同

甘草為末名二腎散薑湯下濕勝加足夏火盛加苓連

此足太陰陽明藥也陳皮燥濕而利氣濕去則痰潤氣順則痰行食鹽

寒飲

潤下而軟堅潤下則痰降軟堅則痰消痰在胸中故用甘草引之入胃  
且草經蜜炙能健脾胃脾胃健則痰自行矣虛弱人慎用朱丹溪曰  
痰以養痰則虛而愈弱

桂苓甘术湯

治心下有痰飲胸脇支滿目眩稀者為飲稠者為痰痰飲積于厥陰心也則胸

脇支滿痰飲阻其包中之腸水精不能上布故目眩

茯苓桂枝

白术甘草兩二兩二兩

此足太陰藥也喻嘉言曰茯苓治痰飲伐腎利滲水道桂枝通陽氣開

經絡和營衛白术燥痰水除脹滿治風眩甘草得茯苓則不資滿而反

泄滿故本草曰甘草能下氣除煩滿此症為痰飲阻抑其陽故用陽藥

以升陽而化氣也

金匱曰短氣有微飲者當從下便去之桂苓甘术湯主之腎氣丸亦主之按腎氣丸亦通陽行水之藥也

清氣化痰丸

治熱痰熱痰者痰因火盛也痰即有形之火火即無形之痰隨火而升降火引痰而橫行變生諸症不可

清氣化痰丸

紀火借氣于五臟其借于五味氣有餘則為火液  
有餘則為痰故治痰者必降其火治火者必順其氣也

半夏黃芩星兩橘紅枳實蘇杏仁去皮栝實仁油黃芩步茯苓一

薑汁糊丸淡薑湯下

此手足太陰之藥治痰火之通劑也氣能發火火能役痰半夏南星以  
燥濕氣黃芩栝實以平熱氣陳皮以順氣杏仁以降逆氣枳實以破  
積氣茯苓以行水氣水濕火熱皆生痰之本也蓋氣之亢而為火猶民  
之反而為賊賊平則還為良民而復其業矣火迫則還為正氣而安其  
位矣故化痰必以清氣為先也

順氣消食化痰丸治酒食生痰胸膈膨悶五更咳嗽過飲則脾濕

賦之物皆能生痰痰于胸膈故謂之痰咳  
嗽由胃有食積至此時大無諸入肺中故咳

半夏黃芩胆星一青皮陳皮白朮萊服子生蘇子清山查步茯苓神

趙 葛根

杏仁

去皮香附

薑汁和燕餅糊

北各一斤半

角生葛根一斤同煮至兩星無白點為度去皂角切同曬乾用

此手足太陰藥也痰由濕生半夏南星所以燥濕痰由氣升蘇子腹子

杏仁所以降氣痰由氣滯青皮陳皮香附所以導滯痰因于酒食葛根

神趙所以解酒山查麥芽所以化食濕去食消則痰不生氣順則咳嗽

止痰滯既去滿悶自除也外感久則鬱熱內傷久則火炎俱要開鬱順

燥其七情氣逆者順氣為先停水宿食者分導為要氣血虛者補之飲之不宜妄用高劑

清肺飲

治痰濕氣逆而咳嗽

肺受火鬱則氣逆而為痰脾有停濕則生痰而作痰病有五臟六腑之殊而其要皆

歸于肺以肺為五臟華蓋下通膀胱外連皮毛為氣之主而出聲也大

法新嗽脈浮為表邪宜發散脈實為內熱宜清利脈濡散為肺虛宜溫

補久嗽曾經解利以散為宜但虛飲食不運宜溫中助胃兼治嗽藥○

帝問曰肺之能令人咳何也曰五臟六腑皆令人咳非獨肺也皮毛者

肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也五臟各以其時受病非其

時各傳以與之有自外得者肺主皮毛風寒暑濕之和自皮毛入內傳

之



藏府而為嗽也有自內傷者七情傷飽內有所傷則邪氣上逆肺為氣出入之道故五藏之邪上蒸于肺而為嗽也然風寒暑濕有不為嗽者蓋所感者重不留于皮毛徑傷藏府而成傷寒溫熱諸症七情亦有不為嗽者蓋病尚淺只在本藏未傳入肺所以傷寒以有嗽為輕而七情似飽之嗽必久而後發也

杏仁

去皮尖

貝母

茯苓

一錢

桔梗

甘草

五味子

橘紅

五分

加薑煎

食遠服若春時傷風咳嗽鼻流清涕宜清解加薄荷防風紫蘇炒本夏多火熱宜清降加桑皮麥冬黃芩知母石膏秋多濕熱宜清熱利濕加蒼朮桑皮防風梔子冬多風寒宜解表行痰加麻黃桂枝乾薑生薑平夏防風火嗽加青黛結裏海石食積痰加香附山楂枳實濕痰除貝母加半夏南星燥痰加橘裏知母天冬年前嗽屬胃火宜清胃加石膏黃連午後嗽屬陰虛宜滋陰降火加黃歸身地知柏二冬竹瀝薑汁傳送黃昏嗽為火浮于肺不可用涼藥宜五倍五味調子欬而降之勞嗽見

傷風  
咳嗽

血多起肺受熱利宜加歸芍阿膠天冬知母欬冬紫苑之類久嗽肺虛  
加參耆如肺熱天參用沙參可也

此手太陰之藥治肺之通劑也杏仁解肌散寒降氣潤燥貝母清火散  
結潤肺化痰五味斂肺而寧嗽茯苓除濕而理脾橘紅行氣甘草和中  
桔梗清肺利膈載藥上浮而又能開鬱發表也

金沸草散

治肺經傷風

頭目昏痛咳嗽多痰

風盛則氣壅氣壅則痰生故頭目昏痛而咳嗽

○此方云傷風感風者鼻流涕痛傷冷者懷清性寒扶熱為焦煩受濕為之而瘀血則胸悶腕脛水則心下怔忡或實或虛或痰之類白睡之確例從可知也

旋覆花

即金前胡

細辛

錢一

荊芥

錢半

赤茯苓

六分

半夏

五分

甘草

炙三分

加

蘇秦煎局方加麻黃赤芍無赤茯苓細辛

王儼說義曰局方辛平活人辛溫

如滿閣加枳

殼桔梗有熱加柴胡黃芩頭加川芎

痰嗽

此手太陰藥也風熱上壅荊芥辛輕發汗而散風痰涎內結前胡旋覆  
消痰而降氣半夏燥痰而散逆甘草發散而和中茯苓行水細辛溫經  
蓋痰必挾火而兼濕故下氣利濕而症自平茯苓用赤者入血分而瀉  
丙丁也小腸為丙火心為丁火三因方云一婦人牙痛治瘥  
不効口煩皆腫以金沸草散火劑煎湯漱而愈

百花膏

治喘嗽不已或痰中有血虛人尤宜

百合

欬冬花等分蜜丸龍眼大食後臥薑湯下或喻化加紫之

百部烏梅名加味百花膏治同煎亦可

此手太陰藥也欬冬瀉熱下氣清血除痰百合潤肺寧心補中益氣並

為理嗽要藥

三仙丹

百一

治中脘氣滯痰涎不利

按氣滯不通為氣痰  
走注攻刺亦曰氣痰

南星麴

半夏麴

四香附二

糊丸薑湯下

痰厥

此足陽明手足太陰藥也。夏以燥脾胃之痰，香附以快三焦之氣，使

氣行則痰行也。子機微義曰：此方與局方四七湯指迷茯苓丸皆行痰

肺氣藥也。厚朴脾胃氣藥也。香附肝氣藥也。隨氣而下，不可不分。又

云：嚴氏以人之七情結氣，滯生痰，氣道不利，痰自降下。又有原有積

痰，其氣因痰而結，滯者必先逐去，痰結則氣自行，豈可尚主一說。有

一咳痰即出者，脾濕勝而痰滑也。宜半夏南星皂角之屬，燥其脾，若利

氣之利所當忌也。有連咳痰不出者，肺燥勝而痰滿也。宜枳殼紫蘇杏仁之屬，利其肺，若燥脾之劑所當忌也。

半夏天麻白木湯東垣治脾胃內傷眼黑頭眩頭痛如裂身重如山惡心

煩悶四肢厥冷謂之足太陰痰厥頭痛痰厥者濕痰厥逆而上也。痰逆

黑色也。東垣曰：太陰頭痛必有痰也。少陰頭痛足寒而氣逆也。太陰

少陰三經雖不上頭，然痰與氣逆壅于腦中，頭上氣不得陽而為痛也。  
半夏製麥芽神曲炒白米錢炒蒼朮酒浸人參黃耆製陳皮茯苓  
澤瀉天麻五分乾薑三分黃柏二分每服五錢  
此足太陰藥也。痰厥頭痛非半夏不能除。半夏燥痰，頭旋眼黑虛風內

作非天麻不能定天麻有風不動名定風藥黃耆人參甘溫可以瀉火亦可以補中

二木甘苦而溫可以除痰亦可以益氣去濕故除痰苓瀉瀉熱導水陳

皮調氣升陽神麴消食蕩胃中滯氣麥芽化結助成已運行胃為虎上

乾薑辛熱以滌中寒黃柏苦寒酒洗以療少火在泉發躁也李東垣曰

受之風寒傷上邪從外入令人頭痛身重惡寒此陽寒頭痛也頭痛耳

鳴九竅不利腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者過在手太陽少

陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛顛疾者下虛上實也過在足太陽

少陰其則入腎風濕頭痛也如頭半寒痛者先取手太陽陽明次取足

少陽陽明此偏頭痛也自厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓者以喘

為主腦逆故今頭痛而亦痛有其頭痛者其者腦虛痛手足寒至節死

不治頭痛每以風藥治之者高麗之上唯風可到味之薄者陰中之陽

乃自地升天者也太陽頭痛惡風寒脈浮常川芎黃芩同治麻黃之類

為主少陽頭痛脈弦細往來寒熱柴胡黃芩芍藥同治麻黃之類

惡寒脈浮緩長實者升麻湯後自汗發熱

或腹痛為痰癖其脈沉緩者木香夏南星為主少陰頭痛三陰三陽經

不流行而足寒氣逆為寒厥其味沉細麻黃附子細辛湯主之厥陰頭

頂痛或吐涎沫厥冷脈浮緩者柴胡黃芩湯主之而虛頭痛當歸川芎為主

氣虛頭痛人參黃耆為主氣血俱虛頭筋痛中益氣湯少加川芎黃耆

停痰  
勞痛

子細辛清肺潤燥頭痛藥也白木半夏天麻湯痰厥頭痛藥也兼治  
附子湯厥逆頭痛藥也如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治昂按  
以苦吐之瓜蒂散  
濃茶之類是也

茯苓丸  
方指迷

治痰停中脘兩臂疼痛

依伏于內停滯中脘脾主四肢脾  
濡而氣不平故上行攻臂其脈沉

是也

半夏  
一兩

只殼五錢風化硝二錢半如一時米易成但以拌  
乳拌木枳殼熬炒風化硝二錢半如一時米易成但以拌

是即名加芒硝  
刮取亦可

薑汁糊丸薑湯下

此足太陽陽明藥也半夏燥濕茯苓滲水枳殼行氣化硝軟堅

去堅生

薑製半夏之毒而除痰使痰行氣通骨痛自止矣

論嘉言曰痰藥雖多此方甚効。痰飲流

入四肢令人肩背酸痛兩手罷軟誤以為風風則非其治宜導痰湯加木  
香薑黃各五分輕者指迷茯苓丸重者控涎丹外有血虛不能榮筋而

致臂痛宜歸脾四  
物湯各半貼和服

痰涎

控涎丹  
一名妙應  
方

治人忽患胸背手足腰項筋骨牽引鈎痛走易不定

或手足冷痺氣脉不通此乃痰涎在胸膈上下誤認癰瘰非也

甘遂去心去皮大戟去皮白芥子等分爲末糊丸臨臥薑湯服五七丸至十九

痰猛加丸數脚氣加板榔木瓜松脂卷柏驚痰加硃砂全蝎驚氣成塊

加穿山甲鱉甲延胡索蓬木熟痰加盆硝寒痰加胡椒木香薑桂

此手足太陽太陰藥也上出陽加減行水到藥亦照劑李時珍曰痰涎爲物隨氣升降

無處不到入心則迷成癲癇入肺則寒痰爲喘咳背冷入肝則脇痛乾

嘔寒熱往來入經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引釣痛入皮肉則癰癰

癰腫疎無擇三因方並以控涎丹主之殊有奇効此乃治痰之本痰之

本水也濕也得氣與火則結爲痰大戟能泄藏府水濕甘遂能行經隧

水濕直達水氣所結之白芥子能散皮裏膜外痰氣唯導用者能收奇

功也

氣痰

三子養親湯

治老人氣實痰盛喘滿懶食

痰不自動因火而動氣有餘便是火氣盛上湧故喘

痰火塞胸故難食

紫蘇子

沉水者

白芥子

萊菔子

各微炒研煎服或等分或看病所主

為君

此手足太陰藥也白芥子除痰紫蘇子行氣萊菔子消食然皆行氣豁

痰之藥氣行則火降而痰消矣

吳鶴皋曰治痰先理氣此治標耳終不若陳能健脾去濕有治本之功也李

士材曰治病先攻其甚若氣實則喘氣反為本痰反為標矣是在智者肺而明之若氣虛者非所宜也

除痰湯

治中風痰迷心竅舌強不能言

心在竅為舌心別脈繫舌根脾脈連舌本散舌下腎脈挾

舌本三脈虛則痰涎乘虛閉其脈道故舌不能轉逆言訥也若三脈亡血不能榮養而瘖者又當加補血藥。風痰塞其經絡舌強不能言其

症為重若兼熱上攻舌腫不能轉者其症為輕

半夏

製胆星

枳實

茯苓

人參

葛蒲

竹茹

諸方與解

代五

三子養親湯

經痰濁

三三



分五 加蓋

種痰  
怪精

礞石滾痰丸

王隱

治實熱老痰怪症百病

風木太過冠製脾土氣不運  
化積滯三痰壅塞上中二焦

通薄腸胃開折之處謂之老痰變生百病不  
可測端非尋常藥餌所能療也此丸主之

青礞石

一兩

沉香

錢五

大黃

酒蒸黃芩

兩八

右將礞石打碎用朴硝一兩同入

瓦礮鹽泥固濟晒乾火煨石色如金為度研末和諸藥水丸量人虛實

此乎少陰足太陰藥也心脾不足風邪乘之而痰與火塞其經絡故舌

本強而難語也人參茯苓甘草補心益脾而瀉大陳皮南星半夏利氣

燥濕而祛痰薑蒲開竅通心枳實破痰利膈竹茹清燥開鬱使痰消火

降則經通而舌柔矣

論嘉言曰此症最急此藥最緩有兩不相當之勢  
審其屬熱用此湯調下牛黃丸審其屬虛用此湯

調下二丹九應是開痰通竅附二丹九丹參熟地天冬兩半麥冬茯苓神

甘草一兩丹砂人參薑蒲遠志五錢蜜九安神養血清熱息風服之得

睡。育風中心脾自有痰塞心竅者有風寒壅滯者致舌本木強又  
有氣虛血虛腎虛及老人暴不能言者宜十全大補湯加薑蒲遠志

服之薑湯送下服後仰卧令藥在胸膈之間除逐上焦痰滯不宜飲水

行動昂按凡藥必先入胃然後能分布于藥經某絡胃乃人身分金之

頭痛之藥亦必令之上助于頭耶吐痰水上以礞石未搽之痰即隨

下故為利痰聖藥礞石最過無金星者不堪用陳久者佳新者火毒

未除此手足太陰陽明藥也礞石剽悍之性能攻陳積伏歷之痰大黃湯熱

去濕以開下行之路薑冬瀉肺凉心以行上僭之火沉香能升降諸氣

上至天而下至泉以導諸藥為使也然皆峻劑非體實者不可輕投王

君曰痰症古今未詳方書雖有五飲諸飲之異而究莫知其為病之源

或頭風作眩目運耳鳴或目眼蠕動眉稜耳輪痛癢或四肢游風腫硬

似疹非疹或為齒頰癢痛牙齒浮而痛癢或暖氣吞酸心下嘈雜或痛

或噦或咽噎不利咯之不出嚥之不下其痰似墨有如破絮桃膠蛻肉

之狀或心下如停水鐵心氣冷痛或夢寐奇怪之狀或足腕酸軟腰背

骨節卒痛或四肢筋骨疼痛難臥名狀並無常處以致手背麻痛狀若

風濕或脊上一條如線之寒起者或渾身習習如卧芒刺者或眼精濕

癢口糜舌爛喉痺等症或迷頂枯核狀若瘰癧或胸腹間如有二氣交

組噎息煩悶有如烟火上衝頭面烘熱或為失志顛癇或中風癱瘓或勞瘵荏苒之疾或風毒脚氣或心下怔忡如畏人捕或喘嗽嘔吐或嘔冷涎綠水黑汁甚為肺癰腸毒便膿擊破內外為病百端皆痰所致其狀不同難以盡述蓋津液既凝為痰不復周潤三焦故口燥咽乾大便秘結而如枯骨毛髮焦稿婦人則因此月水不通若能逐去敗又自然服側有効余用滾痰丸以愈諸疾不可勝數特相傳于世云

本方加玄胡粉一兩硃砂為衣治同本方減大黃黃芩各六兩加橘紅

半夏各二兩甘草一兩竹瀝薑汁為丸名竹瀝達痰丸治同方稍和緩

單用礞石一味治如前法名奪命丹楊氏薄荷自然汁蜜調溫服治小兒

急慢驚風痰涎壅盛藥不可下命在須臾

牛黃丸 治風癰迷悶涎潮抽掣風癰或因母腹中受驚或因大驚而得

則痰涎歸之以致痰迷心竅或感風寒暑濕或飲食不節逆于氣鬱而生涎閉塞諸經厥而乃成或數年一發或一日數發發則肢什倒地

昏不知人終旋抽掣口目喎邪或隨藏氣作六畜之聲

胆星 金錫去足 蟬蛻二錢五分 牛黃 白附子 僵蚕洗防風 天麻錢

麝香分五 煮棗肉和水銀五分細研入藥末為丸荆芥薑湯下

此手少陰足太陰厥陰藥也牛黃清心解熱開竅利痰天麻防風南星

全蝎辛散之味蠶蚕蟬蛻清化之品白附頭面之藥去頭面皆能搜肝

風而散痰結麝香通竅水銀劫痰引以薑芥者亦以逐風而行痰也牛

黃丸之方頗多互有異同然大要在乎搜風化痰寧心通竅多用冰麝

牛雄金珠犀珀若中藏者宜之如中府中血脈者反能引風入骨此方

藥味頗簡故姑錄之以概其餘也喻嘉言曰牛黃丸與蘇合丸異治熱

阻關竅宜牛黃丸寒阻關竅宜蘇合丸若手撒口開遺尿等死症急用

參附峻補間有生者若牛黃蘇合入口即斃

辰砂散治風痰諸癇狂心疾諸癇因驚恐憂怒火盛于心痰塞心

身熱脈浮在表者陽癇屬六腑易治身冷脈沉在裏者陰癇屬五臟難治其實痰火與驚而已癲狂亦出于此

辰砂先明者乳香光瑩者棗仁五錢溫酒調下恣飲沉醉聽睡二三日

勿動萬一驚寤不可復治

此手少陰藥也辰砂鎮心瀉心火乳香入心散瘀血棗仁補肝胆而寧心

本方加人參一兩蜜丸彈丸大名寧志膏本每服一丸薄荷湯下治同

痰血迷心

白金丸

治癲狂失心

癲多喜笑尚知畏懼症屬不足狂多忿怒人不能制症屬有餘此病多因驚憂痰血塞于心竅所致

難經曰諸陽為狂諸陰為癲○喜屬心怒屬肝二經皆火有餘之地也

白礬

三兩鬱金七兩

薄荷糊丸

此手少陰藥也白礬酸鹹能軟頑痰鬱金苦辛能去惡血痰血去則心

竅開而疾已矣

風痰

青州白丸子

治風痰湧盛嘔吐涎沫口眼喎邪手足癱瘓小兒驚風

痰壅塞經絡

及痰盛泄瀉

肥人滑泄多屬之痰脉滑責之痰不食不能責之痰

白附子

生用南星

生用半夏

水浸生衣

川烏

去皮臍生

用五錢

為末絹袋盛之

水攤出粉未盡再搗再攤以盡為度貯磁盆中暴夜露春五日夏三秋  
七冬十日晒乾糯米糊丸如棗豆大每服二十丸薑湯下癰瘕酒下驚  
風薄荷湯下三五丸

此足厥陰太陰藥也痰之生也由風由寒由濕故用半夏南星之辛溫  
以燥濕散寒川烏白附之辛熱以溫經逐風浸而暴之者殺其毒也

言曰此治風痰之上藥也然熱痰迷竅者非所宜施

風痰  
星香散 治中風痰盛體肥不渴者

胆星八錢木香二錢為末服或加全蝎

此足厥陰藥也南星燥痰之品製以牛胆以殺其毒且胆有益肝胆之

功肝胆之經佐以木香取其行氣以利痰也木香能疎肝氣和脾氣肥而不湯宜

燥可知加全蝎者以散肝風也中風體虛有痰者宜用此散

子或六君子湯調下此散

切痰  
截截

醫方集解

卷五

常山飲局

瘧久不已者用此截之

瘧初起不宜藥禁則邪氣未盡發生能症發久則可截之

常山

燒酒炒五錢

草果

煨榔

知母

貝母

錢一

烏梅

二

薑三片棗一枚

半酒半水煎露一宿日未出時面東空心溫服渣用酒浸煎待瘧將發

時先服一方有良薑甘草無煨榔一方加穿山甲甘草

此足少陰太陰藥也古云無痰不作瘧常山引吐行水祛老痰積飲

榔下氣破積能消食行痰陰陽不和則瘧作陽勝則熱陰勝則寒知母滋陰能治

陽明獨勝之火草果辛熱能治太陰獨勝之寒貝母清火散結瀉熱除

痰烏梅酸斂潛收生津退熱欬陰故退熱合為截瘧之劑也趙以德曰常山本草知母草菓

常山甘草烏梅煨榔穿山甲皆云治瘧集以成方者為知母性寒入足陽明治獨勝之熱使退就太陰草菓溫燥治足太陰獨勝之寒使退就

陽明二經和則無陰陽交錯之變是為君藥常山主寒熱瘧吐胸中痰結是為臣藥甘草和諸藥烏梅去痰核榔除痰癖破滯氣是為佐藥穿

山甲穴山而居遇水而入則是出入陰陽貫穿經絡于榮分以破暑結乙卯為便藥也若脾胃有熱痰者用之收効李士材曰瘧山生用後用

前也  
口發  
為陽  
分夜  
發為  
陰分  
瘧疾

截瘧七寶飲

治瘧久發不止寸口脉弦滑浮大者

瘧疾為肝風滑

大為陽瘧沉

不問鬼瘧食瘧並皆治之

瘧有經瘧藏瘧寒瘧風瘧溫瘧暑瘧濕瘧痰瘧食瘧瘵瘧

鬼瘧之別

常山草菓

煨

檳榔

青皮

厚朴

陳皮

甘草

等分用酒水各

一鍾煎熟絲綿蓋之露一宿于當發之早而東溫服

瘧正發時不可服藥醫曰工不能治

其已發為其氣逆也若正發而服藥反能助熱

此足少陰太陰藥也常山能吐老痰積飲檳榔能下食積痰結草菓能

消太陰膏梁之痰陳皮利氣厚朴平胃青皮伐肝

肝邪

皆為溫散行痰



之品加甘草入胃佐常山以吐瘧痰也玉機微義曰上方乃溫脾燥烈

者值病人陰陽相并脾氣鬱結濁液凝滯閉塞中脘因得燥熱亦以暫開所以氣通而疾止若中風虛弱內有鬱火之人復用燥熱愈切愈虛  
告將誰執楊仁齋曰瘧有火有血惟水飲所以作寒熱惟痰血所以增寒熱常山能逐水固也若是血虛當用五靈脂桃仁為佐入生薑蜜同煎荷無行血之品何以收十全之功即保命集云瘧夜發者乃邪氣深遠而入血分為陰經有邪宜加桃仁子桂麻黃湯中發散血中之風寒按瘧盡發屬氣夜發屬血

消導之劑清者散其積也導者行其氣也脾虛不運則氣不流行氣

少五藏無所資稟血氣日以虛衰因致危困者多矣故必消而導之輕則用和劑之常劑重必假峻下之湯凡茲濁陰不降則清陽不升

平胃散方治脾有停滯痰飲痞滿宿食不消滿悶嘔瀉及山嵐瘴氣不

服水土土濕太過木邪乘所不勝而飭之脾虛不能健運故有痰食留

山嵐瘴氣

蒼朮

二錢

厚朴

炒

陳皮

白

甘草

錢一

加

蘇

蘇

蘇

蘇

蘇

枳實

濕勝

加五

苓

痰多

加半

夏

脾倦

不思

食

加參

者

煎

加枳

大便秘

加

大

黃

芒

硝

小

便赤

加

苓

瀉

傷

氣

加葱

此足

太

陰

陽

明

藥

也

蒼

朮

辛

烈

燥

濕

而

能

消

實

滿

半

陳

皮

辛

溫

有

君

而

行

痰

使

泄

中

有

補

務

令

濕

土

底

于

和

平

也

本

方

加

蘇

香

半

夏

名

蘇

香

不

換

金

正

嘔

吐

及

痺

疫

濕

瀉

再

加

人

參

茯

苓

草

感

風

寒

內

傷

生

冷

夾

食

停

痰

麻

痺

瘟

方

合

二

陳

加

蘇

香

名

除

濕

湯

治

傷

濕

藥

本

粗

殼

桔

梗

名

和

胃

散

治

四

時

傷

寒

頭

痛

煩

燥

自

汗

咳

嗽

吐

利

本

方一兩加桑白皮一兩名對金飲子治脾胃受濕腹脹身重飲食不進

肢痠膚腫本方除蒼朮加水香薷乾薑茯苓名厚朴溫中湯治脾胃

虛寒心腹脹滿及秋冬客寒犯胃時作疼痛散以辛熱佐以苦甘寒以

本方加麥芽炒麴名加味平胃散治宿食不消吞酸噯臭

健脾胃  
消痞除痰健脾胃進食消痞除痰消食也

白朮三兩枳實二兩為末荷葉包陳米飯煨乾為北疔悶加陳皮氣

滯加水香傷食加麥芽神麴

此是太陰陽明藥也李東垣曰白朮甘溫補脾胃之元氣其苦味除胃

中濕熱利腰膈間血過于枳實化之藥一倍枳實苦寒泄胃中痞滿

化胃中所傷是先補其虛而後化其傷則不峻矣荷葉中空色青形仰

象震在人為少陽胆生化之根蒂也飲食入胃營氣上行即少陽中胆

之氣也胃氣元氣穀氣甲胆上升之氣一也食藥感此氣化胃氣何由  
不上升乎燒飯與曰木協力滋養穀氣補令胃厚不至再傷其利廣矣  
王安道曰勞倦飲食難俱為內傷然勞傷傷氣不足矣飲食傷又當于  
不足之中分其有餘夫飢餓不飲食者胃中虛此為不后而傷也飲  
食自飽腸胃乃傷者此不足之中兼有餘而傷也惟其不后故補益惟  
其有餘故消導亦有物滯氣傷消補兼行者亦有物滯氣不勝但須消  
導者亦有不須消導但須補益者枳木丸之類雖曰消導固者補急之  
意焉若所滯之物非枳木丸之方所能去者滿急丸煮黃丸瓜蒂散等  
諸方東垣亦未嘗  
委之而勿用也

木方作湯名枳木湯金匱治水飲心下堅大如盤邊如旋盤心下上焦屬

之水本方加半夏一兩名半夏枳木丸治脾濕停痰及傷冷食淋者加澤

瀉一兩本方加橘皮一兩名橘皮枳木丸治飲食不消氣滯痞悶木方

加陳皮半夏名橘半枳木丸健脾消痞化痰本方加木香一兩名木香

枳木丸治氣滯痞滿木香平肝行氣使木不尅金再加砂仁名香砂枳木丸破滯氣

傷食  
傷飲

保和丸

治食積飲停腹痛泄瀉痞滿吐酸積滯惡食食瘡下利

傷于食  
傷于飲

消飲食強脾胃如加乾薑五錢名木香乾薑枳朮丸兼治氣寒再入  
參陳皮名木香人參乾薑枳朮丸開胃進食本方加神麴麥芽各一兩  
名麴蘖枳朮丸治內傷飲食或泄瀉本方加酒炒黃連黃芩大黃炒神  
麴橘紅各一兩名三黃枳朮丸治傷肉食濕麴辛熱味厚之物填塞悶  
亂不快本方加茯苓五錢乾薑七錢名消飲丸治停飲胸滿嘔逆

運化滯于腸胃故有泄痢食瘡等症傷而未甚不欲故以厲劑推以手  
和之品清而化之故曰保和丸東垣曰腸欲清無形之氣也宜發汗利  
小便以導其濕傷食者有形之物也輕則消化或損其穀重者方可吐  
下麻瀉云大腸有宿食寒發熱有時如瘧輕則消導重則下之當求  
之傷  
食門

山查

三兩去核或神麴

茯苓

半夏

陳皮

萊菔子

微炒連翹五錢

麴糊丸麥芽湯下或加麥芽入藥亦可

脾虛  
氣弱

此足太陰陽明藥也山查酸溫收縮之性能消油膩腥膻之食收縮故食消

神麴辛溫蒸嘗之物曾過能消酒食陳腐之積服子辛甘下氣而制麴

麥芽鹹溫消穀而軟堅堅積傷食必兼乎濕茯苓補脾而滲濕積久必

變為熱連翹散結而清熱半夏能溫能燥和胃而健脾陳皮能降能升

調中而理氣此內傷而氣未病者但當消導不須補益大安丸加白朮

則消補兼施也

本方加白朮白芍去半夏服子連翹蒸餅糊丸名小保和丸助脾進食

本方加白朮二兩名大安丸或加人參治飲食不消氣虛微邪本方加

白朮香附黃芩黃連厚朴枳實治積聚痞塊本方合越鞠丸扶脾開鬱

健脾丸 治脾虛血弱飲食不消

人參 白朮土炒 陳皮 麥芽炒 山查去核 枳實三 神麴 糊丸 米

此方長洋前 藥名在案 建界

美

卷之六

以健脾也

茯苓連黃連歸芍藥

後血充然

樂方

荷葉燒飯丸名理氣健脾丸治脾胃

虛弱久瀉久痢本方去人參山查麥芽加神麴川芎香附麴丸名舒  
 鬱健脾丸治脾氣鬱滯飲食不消本方去山查麥芽加半夏胆星蛤粉  
 茯苓神麴糊丸名化痰健脾丸治內傷挾痰本方去人參山查麥芽加  
 半夏山梔黃連水丸名清火健脾丸治脾虛有火本方去人參山查麥  
 芽加木香枳榔厚朴半夏甘草名和中健脾丸治胃虛飢不欲食再加  
 人參名妙應丸治胃虛不能食藏府或結或瀉本方去山查加半夏青  
 皮木香砂仁草蔻乾薑炙甘草茯苓澤瀉蒸餅丸名寬中進食丸  
 東垣補脾胃進飲食

枳實消痞丸

東垣

治心下虛痞惡食懶倦右關脈弦

脾虛不運故痞滿惡食脾主四肢故痞

倦右關脈脾脈弦者脾虛而木來侮之也。經曰太陰所至為積飲痞  
 滿皆陰勝陽也受病之藏心與脾也因而鬱塞為痞者火與濕也蓋心  
 陽火也主血脾陰土也主治凡傷其陽則火拂鬱而血凝  
 傷其陰則上壅塞而濕聚陰陽之分施治之法不可同也

諸方集解

卷五 枳實消痞丸



枳實越黃連五錢厚朴蜜炒四錢半夏麴麥芽炒人參白朮土茯苓

錢甘草系乾薑二錢蒸餅糊丸

此足太陰陽明藥也枳實苦酸行氣破血脾無積血心下不痞黃連苦寒瀉熱開鬱並消痞之君藥厚朴苦降散濕滿而化食厚腸麥芽鹹溫助胃氣而軟堅破結半夏燥痰濕而和胃乾薑由惡血而通肝開五藏六府皆所以散而瀉之也參朮甘草甘溫補脾使氣足脾運而痞自化既以助散瀉之力又以固本使不傷真氣也王機微義曰此半夏瀉心湯如減法也內有枳朮四君子胃脾藥利濕消

痞補虛之劑也

脾積 痞氣丸東垣治脾積在于胃脘大如盤久不愈令人四肢不收或發黃疸

飲食不為肌膚金匱云堅而不移者名積為藏病推移不定者名聚為飲填塞痞滿皆上病也與服滿有輕重之分痞推內覺滿悶服滿則外有脹急之形也前人皆指誤下所致蓋傷寒之病由下誤下則裏氣虛

有欲食痰積不能消化而成痞者有熱熱太甚上來心下而成痞者古  
方用黃連黃芩枳實之苦以瀉之厚朴半夏生薑之辛以散之入參  
上之甘苦溫以補之茯苓澤瀉之淡以滲之難宜上下分消其氣果有  
自實之症庶可畧施疎導世人苦于痞塞常用利藥  
暫時通快藥過滋其毒不察天下多亡陰之患也

黃連八錢厚朴五錢吳茱萸三錢白朮上黃茯苓錢茵陳酒洗乾薑炮砂仁錢人參錢

茯苓錢澤瀉錢川芎錢川椒錢桂錢巴豆錢附子錢炙甘草錢湯下

此足太陰陽明藥也黃連瀉熱燥濕治痞君藥仲景治痞諸方用之厚朴砂

仁行氣而散滿茵陳苓瀉利水以宣脾黃芩清肺而養陰椒黃燥脾而

逐冷薑桂川烏補命火以生脾土而薑桂又能去痰生新建和實皆血

藥巴豆能消有形積滯為斬關奪門之將驅之以為先驅加參朮者以

補脾元正氣正旺然後可以祛邪也潔古曰養正積自除李東垣曰痞

殺之於上也心主血心虛而邪陷于血之分故攻心下痞宜連脾胃以

血藥治之若全用氣藥則病益甚而復下之氣愈下降必變為中滿故

張氏世有用氣藥治疝而  
不効者蓋未明此理也

本方除吳茱萸白朮茯苓澤瀉茵陳川椒砂仁加薑蒲茯苓神丹參紅豆  
名伏梁北治心積起膈上至心下大如臂令入煩心本方除吳茱萸砂仁  
桂木黃芩澤瀉加柴胡黃連犀角昆布甘草名肥氣北治肝積在左脇  
下有頭足令人發咳痰癥不已本方除吳茱萸白朮砂仁黃芩茵陳澤瀉  
加紫苑桔梗天冬白朮陳皮青皮三稜名息黃北淡薑湯下治肺積在  
左脇下令人酒漸寒熱咳喘發肺癰秋冬黃連減半本方除吳茱萸白朮  
砂仁人參乾薑川椒黃芩茵陳加薑蒲丁香附子苦棟延胡索獨活全  
蝎名黃脉北淡鹽湯下治腎積發于小腹上至心下若豚狀上下無時  
令人喘咳骨痠及男子疝女子瘕聚帶下此東垣五積方也雖有咳  
力贊助成功經曰大積大聚其可犯也其大半而止過者  
死矣此方五積九非東垣之方也故醫方者中皆不錄

酒積

葛花解酲湯 專治酒積或嘔吐或泄瀉痞塞頭痛小便不利酒大熱有

所釀成故熱而重濕熱積于腸胃故難治

葛花 豆蔻 砂仁 錢木香 分 青皮 陳皮 人參 白朮 茯苓 分

神麴 乾薑 猪苓 澤瀉 分

此手足陽明藥也過飲無度濕熱之毒積于腸胃葛花獨入陽明令濕

熱從肌肉而解豆蔻砂仁皆辛散解酒故以為君神麴解酒而化食木

香乾薑調氣而溫中青皮陳皮除痰而疏滯二苓澤瀉能驅濕熱從小

便出乃內外分消之劑飲多則中氣傷故又加參朮以補其氣也人參

最能解酒李東垣曰酒大熱有勢無形之物也傷之只當發汗次利小

便上下分消其濕氣今人或用酒為丸太熱之藥下之或用大黃牽牛

下之是無形元氣受傷反損有形陰血陰血愈虛陽毒太旺元氣消亡

而虛損之病成矣或曰葛花解酒而發散不如枳椇一名雞距一

名木葉纏霜黃赤而味甘其葉入酒酒化

為木門外植此木青房內酸酒多不佳

葛花解酲湯

張母

驚甲飲

治瘧久不愈腹中結塊名曰瘧母

瘧久不愈為瘧母成癥乃

肝之積也瘧久少陽經脈與肝相表裏久瘧居在血分

驚甲

天

白木

上實者

芎藭

白芍

少樛榔

草菓

厚朴

陳皮

甘草

等分

三片

聚一枚

烏梅

少許煎

此是少陽厥陰太陰藥也久瘧必由脾虛白朮補脾氣黃耆補肺氣使

氣足脾運方能磨積也川芎補肝而和血中氣滯芍藥助脾而散肝經

火邪二藥並和厥陰榮氣榮血調則陰陽和矣除陽爭故樛榔下氣而

攻積草菓煖胃而祛寒厚朴破血而散滿陳皮理氣而消痰甘草和中

而補土驚甲鹹平屬陰色青入肺尚能益陰補虛消熱散結故為瘧瘧

之君藥也